




Series : W2YXZ

रोल नं.  
Roll No.



SET ~ 1



प्रश्न-पत्र कोड  
Q.P. Code **56/2/1**

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

**नोट / NOTE**



(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 23 हैं।  
Please check that this question paper contains 23 printed pages.

(II) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 33 प्रश्न हैं।  
Please check that this question paper contains 33 questions.

(III) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।  
Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.

(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में यथा स्थान पर प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।  
Please write down the serial number of the question in the answer-book at the given place before attempting it.

(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।  
15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the candidates will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



**रसायन विज्ञान (सैद्धांतिक)  
CHEMISTRY (Theory)**



निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

~~~~~

56/2/1

**731-1**



---

## सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका पालन कीजिए :

- (i) इस प्रश्नपत्र में 33 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) यह प्रश्नपत्र पाँच खण्डों में विभाजित है – खण्ड क, ख, ग, घ तथा ङ।
- (iii) खण्ड क – प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।
- (iv) खण्ड ख – प्रश्न संख्या 17 से 21 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है।
- (v) खण्ड ग – प्रश्न संख्या 22 से 28 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है।
- (vi) खण्ड घ – प्रश्न संख्या 29 तथा 30 प्रकरण आधारित प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है।
- (vii) खण्ड ङ – प्रश्न संख्या 31 से 33 दीर्घ-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड क के अतिरिक्त अन्य सभी खण्डों के कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन दिया गया है।
- (ix) ध्यान दें कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए अलग प्रश्न-पत्र है।
- (x) कैल्कुलेटर का उपयोग वर्जित है।

जहाँ आवश्यक हो, आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मानोंका उपयोग कर सकते हैं :

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान (m_e) = } 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg.}$$

$$\text{न्यूट्रॉन का द्रव्यमान = } 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

$$\text{प्रोटॉन का द्रव्यमान = } 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

$$\text{आवोगाद्रो संख्या = } 6.023 \times 10^{23} \text{ प्रति ग्राम मोल}$$

$$\text{बोल्ट्जमान नियतांक = } 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$





---

**General Instructions :**

**Read the following instructions carefully and follow them :**

- (i) *This question paper contains 33 questions. All questions are compulsory.*
- (ii) *This question paper is divided into **FIVE** sections – Section A, B, C, D and E.*
- (iii) ***Section A** – questions number 1 to 16 are multiple choice type questions. Each question carries 1 mark.*
- (iv) ***Section B** – questions number 17 to 21 are very short answer type questions. Each question carries 2 marks.*
- (v) ***Section C** – questions number 22 to 28 are short answer type questions. Each question carries 3 marks.*
- (vi) ***Section D** – questions number 29 and 30 are case-based questions. Each question carries 4 marks.*
- (vii) ***Section E** – questions number 31 to 33 are long answer type questions. Each question carries 5 marks.*
- (viii) *There is no overall choice given in the question paper. However, an internal choice has been provided in few questions in all the sections except Section –A.*
- (ix) *Kindly note that there is a separate question paper for Visually Impaired candidates.*
- (x) *Use of calculator is NOT allowed.*

*You may use the following values of physical constants wherever necessary :*

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\text{Mass of electron (m}_e\text{)} = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg.}$$

$$\text{Mass of neutron} = 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

$$\text{Mass of proton} = 1.673 \times 10^{-27} \text{ kg.}$$

$$\text{Avogadro's number} = 6.023 \times 10^{23} \text{ per gram mole}$$

$$\text{Boltzmann's constant} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$$





प्रश्न संख्या 1 से 16 तक बहुविकल्पीय प्रकार के 1 अंक के प्रश्न हैं।

1. 1 मोल  $\text{MnO}_4^-$  को  $\text{MnO}_2$  में अपचयित करने के लिए आवश्यक आवेश है  
(A) 1 F (B) 3 F  
(C) 5 F (D) 6 F
2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?  
(A) शून्य कोटि अभिक्रिया वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है।  
(B) शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्द्ध-आयु, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है।  
(C) किसी अभिक्रिया की आण्विकता शून्य हो सकती है।  
(D) प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए  $t_{1/2} = 0.693/k$
3. अणुओं की संख्या जो किसी प्राथमिक अभिक्रिया में परस्पर अभिक्रिया करते हैं, एक माप होती है  
(A) अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की (B) अभिक्रिया की स्टॉइकियोमेट्री की  
(C) अभिक्रिया की आण्विकता की (D) अभिक्रिया की कोटि की
4.  $[\text{Ar}]3\text{d}^{10}4\text{s}^1$  इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व है  
(A) Cu (B) Zn  
(C) Cr (D) Mn
5. संकुल आयन  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]^{2+}$  तथा  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{ONO})]^{2+}$  कहलाते हैं  
(A) आयनन समावयवी (B) बंधनी समावयवी  
(C) उपसहसंयोजन समावयवी (D) ज्यामितीय समावयवी
6. प्रतिचुंबकीय स्पीशीज़ है  
(A)  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  (B)  $[\text{NiCl}_4]^{2-}$   
(C)  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$  (D)  $[\text{CoF}_6]^{3-}$   
[परमाणु संख्या : Co = 27, Fe = 26, Ni = 28]





## **SECTION – A**

$$16 \times 1 = 16$$

Question No. 1 to 16 are Multiple Choice type questions carrying 1 mark each.

1. The charge required for the reduction of 1 mol of  $\text{MnO}_4^-$  to  $\text{MnO}_2$  is  
(A) 1 F (B) 3 F  
(C) 5 F (D) 6 F

2. Which among the following is a false statement ?  
(A) Rate of zero order reaction is independent of initial concentration of reactant.  
(B) Half-life of a zero order reaction is inversely proportional to the rate constant.  
(C) Molecularity of a reaction may be zero.  
(D) For a first order reaction,  $t_{1/2} = 0.693/k$ .

3. The number of molecules that react with each other in an elementary reaction is a measure of the :  
(A) activation energy of the reaction (B) stoichiometry of the reaction  
(C) molecularity of the reaction (D) order of the reaction


4. The element having  $[\text{Ar}]3\text{d}^{10}4\text{s}^1$  electronic configuration is  
(A) Cu (B) Zn  
(C) Cr (D) Mn

5. The complex ions  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]^{2+}$  and  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{ONO})]^{2+}$  are called  
(A) Ionization isomers (B) Linkage isomers  
(C) Co-ordination isomers (D) Geometrical isomers

6. The diamagnetic species is :  
(A)  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  (B)  $[\text{NiCl}_4]^{2-}$   
(C)  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$  (D)  $[\text{CoF}_6]^{3-}$



7. निम्नलिखित के लिए कौन सा सही IUPAC नाम है ?



(A) मेथिलक्लोरोबेंजीन (B) टॉल्यूइन  
(C) 1-क्लोरो-4-मेथिलबेंजीन (D) 1-मेथिल-4-क्लोरोबेंजीन

8. द्वितीयक ऐल्कोहॉल की क्रोमिक ऐनहाइड्राइड ( $\text{CrO}_3$ ) के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा ?

(A) एल्डहाइड (B) कीटोन  
(C) कार्बोक्सिलिक अम्ल (D) एस्टर

9. फीनॉल का सैलिसिलिक अम्ल में रूपांतरण निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है ?

(A) राइमर-टीमन अभिक्रिया (B) फ्रिडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया  
(C) कोल्बे अभिक्रिया (D) युग्मन अभिक्रिया

10. निम्नलिखित में से कौन सा/से प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है/हैं ?

(A) अंडे की सफेदी का स्कंदन (B) दही का जमना  
(C) रक्त का थक्का बनना (D) (A) और (B) दोनों

11. न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं ?

(A) ग्लाइकोसाइडी बंध (B) पेप्टाइड बंध  
(C) हाइड्रोजन आबंध (D) फॉस्फोडाइएस्टर बंध

12. स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है ?


(A) विटामिन B1 (B) विटामिन B2  
(C) ऐस्कॉर्बिक अम्ल (D) ग्लूटामिक अम्ल





---

7. Which is the correct IUPAC name for



(A) Methylchlorobenzene      (B) Toluene  
(C) 1-Chloro-4-Methylbenzene      (D) 1-Methyl-4-Chlorobenzene

8. What will be formed after oxidation reaction of secondary alcohol with chromic anhydride ( $\text{CrO}_3$ ) ?  
(A) Aldehyde      (B) Ketone  
(C) Carboxylic acid      (D) Ester

9. The conversion of phenol to salicylic acid can be accomplished by  
(A) Reimer-Tiemann reaction      (B) Friedel-Crafts reaction  
(C) Kolbe reaction      (D) Coupling reaction

10. Which of the following is/are examples of denaturation of protein ?  
(A) Coagulation of egg white      (B) Curdling of milk  
(C) Clotting of blood      (D) Both (A) and (B)

11. Nucleotides are joined together by  
(A) Glycosidic linkage      (B) Peptide linkage  
(C) Hydrogen bonding      (D) Phosphodiester linkage

12. Scurvy is caused due to deficiency of  
(A) Vitamin B1      (B) Vitamin B2  
(C) Ascorbic acid      (D) Glutamic acid



---

प्रश्न संख्या 13 से 16 के लिए, दो कथन दिए गए हैं – जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (A), (B), (C) और (D) में से चुनकर दीजिए :

(A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।

(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।

(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत है।

(D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही है।

13. **अभिकथन (A) :** प्रथम कोटि अभिक्रिया में यदि अभिकारक की सांद्रता दोगुनी हो जाती है, तो इसका अर्धायुकाल भी दोगुना हो जाता है।  
**कारण (R) :** प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है।

14. **अभिकथन (A) :** Cu तनु खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया करके  $H_2$  मुक्त नहीं कर सकता।  
**कारण (R) :** Cu का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है।

15. **अभिकथन (A) :** ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीन को गैब्रिएल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है।  
**कारण (R) :** ऐरिल हैलाइड थैलिमाइड से प्राप्त ऋणायन के साथ नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं कर सकते।

16. **अभिकथन (A) :** विटामिन D हमारे शरीर में संचित नहीं हो सकता है।  
**कारण (R) :** विटामिन D वसा में घुलनशील विटामिन है और मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर नहीं निकलता है।





---

For question number **13** to **16**, two statements are given – one labelled as Assertion (A) and the other labelled as Reason (R). Select the correct answer to these questions from the codes (A), (B), (C) and (D) as given below :

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- (D) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.

**13. Assertion (A) :** In a first order reaction, if the concentration of the reactant is doubled, its half-life is also doubled.

**Reason (R) :** The half-life of a reaction does not depend upon the initial concentration of the reactant in a first order reaction.

**14. Assertion (A) :** Cu cannot liberate  $H_2$  on reaction with dilute mineral acids.

**Reason (R) :** Cu has positive electrode potential.

**15. Assertion (A) :** Aromatic primary amines cannot be prepared by Gabriel Phthalimide synthesis.

**Reason (R) :** Aryl halides do not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by phthalimide.

**16. Assertion (A) :** Vitamin D cannot be stored in our body.

**Reason (R) :** Vitamin D is fat soluble vitamin and is not excreted from the body in urine.



## खण्ड – ख

17. (A) शून्य कोटि की अभिक्रिया  $A \rightarrow P$  के लिए वेग स्थिरांक  $0.0030 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$  है।  $A$  की प्रारंभिक सांदर्भता  $0.10 \text{ M}$  से  $0.075 \text{ M}$  तक रह जाने में कितना समय लगेगा ? 2

अथवा

(B) प्लैटिनम सतह पर  $\text{NH}_3$  का अपघटन शून्य कोटि अभिक्रिया है। यदि  $k = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$  है तो  $\text{N}_2$  और  $\text{H}_2$  के उत्पादन की दरें क्या हैं ? 2

18. निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए : 2 × 1

(a) छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया  
(b) अभिक्रिया ( $t_{1/2}$ ) का अर्धायुक्ताल


19. निम्नलिखित प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए : 2 × 1

(a) संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं।  
(b) जिंक संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है।

20. IUPAC मानदंड के अनुसार निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों के नाम बताइए : 2 × 1

(a)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Cl}_2$   
(b)  $[\text{CrCl}_2(\text{en})_2]\text{Cl}$

21. (a) हैलोजन यौगिकों के निम्नलिखित युगल में से कौन सा यौगिक तीव्रता से  $\text{S}_{\text{N}}1$  अभिक्रिया करेगा और क्यों ? 1



(b) निम्नलिखित यौगिकों को  $\text{S}_{\text{N}}2$  प्रतिस्थापन के प्रति उनकी अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए : 1

2-ब्रोमो-2-मेथिलब्यूटेन, 1-ब्रोमोपेन्टेन, 2-ब्रोमोपेन्टेन





## SECTION – B

17. (A) The rate constant for a zero order reaction  $A \rightarrow P$  is  $0.0030 \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$ . How long will it take for the initial concentration of A to fall from  $0.10 \text{ M}$  to  $0.075 \text{ M}$  ? 2

**OR**

(B) The decomposition of  $\text{NH}_3$  on platinum surface is zero order reaction. What are the rates of production of  $\text{N}_2$  and  $\text{H}_2$  if  $k = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$  ? 2

18. Define the following terms : 2 × 1

(a) Pseudo first order reaction  
(b) Half-life period of reaction ( $t_{1/2}$ )


19. Examine the following observations : 2 × 1

(a) Transition elements generally form coloured compounds.  
(b) Zinc is not regarded as a transition element.

20. Name the following coordination compounds according to IUPAC norms : 2 × 1

(a)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})\text{Cl}]\text{Cl}_2$   
(b)  $[\text{CrCl}_2(\text{en})_2]\text{Cl}$

21. (a) In the following pair of halogen compounds, which compound undergoes  $\text{S}_{\text{N}}1$  reaction faster and why ? 1



(b) Arrange the following compounds in increasing order of their reactivity towards  $\text{S}_{\text{N}}2$  displacement : 1

2-Bromo-2-methylbutane, 1-Bromopentane, 2-Bromopentane.






---

### खण्ड – ग


22.  $25^{\circ}\text{C}$  पर पानी का संतृप्त वाष्प दाब  $24\text{ mm Hg}$  है। उसी ताप पर यूरिया के  $5\%$  जलीय विलयन का संतृप्त वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। (यूरिया का मोलर द्रव्यमान  $= 60\text{ g mol}^{-1}$ ) 3

23.  $0.8\text{ cm}^2$  क्षेत्रफल और  $40$  सेमी लंबाई वाले  $0.05\text{ M NaOH}$  विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध  $5 \times 10^3$  ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता की गणना कीजिए। 3

24. निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए :  $3 \times 1$



25. संयोजकता आबंध सिद्धांत का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित के संकरणीकरण और चुंबकीय व्यवहार को समझाइए :  $2 \times 1\frac{1}{2} = 3$



[परमाणु संख्या : Co = 27, Ni = 28]

26. (a) निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :  $2 + 1 = 3$

(i) प्रतिबिंब रूप (एनेनटियोमर)

(ii) रेसिमिक मिश्रण

(b) क्लोरोबेंजीन नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति प्रतिरोधी क्यों हैं ?





---

## SECTION – C

22. At 25 °C the saturated vapour pressure of water is 24 mm Hg. Find the saturated vapour pressure of a 5% aqueous solution of urea at the same temperature. (Molar mass of urea = 60 g mol<sup>-1</sup>) 3

23. The electrical resistance of a column of 0.05 M NaOH solution of area 0.8 cm<sup>2</sup> and length 40 cm is  $5 \times 10^3$  ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. 3

24. Complete and balance the following chemical equations :  $3 \times 1$

(a)  $\text{MnO}_4^- + \text{C}_2\text{O}_4^{2-} + \text{H}^+ \longrightarrow$

(b)  $\text{KMnO}_4 \xrightarrow[513 \text{ K}]{\text{Heat}}$

(c)  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{S} + \text{H}^+ \longrightarrow$

25. Using valence bond theory, explain the hybridization and magnetic character of the following :  $2 \times 1\frac{1}{2} = 3$

(a)  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$

(b)  $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$

[At. no. : Co = 27, Ni = 28]

26. (a) Define the following :  $2 + 1 = 3$

(i) Enantiomers

(ii) Racemic mixture

(b) Why is chlorobenzene resistant to nucleophilic substitution reaction ?




---

27. (A) निम्नलिखित अभिक्रियाओं की व्याख्या कीजिए और सम्मिलित समीकरण लिखिए : **3 × 1**

- (a) वोल्फ-किशनर अपचयन
- (b) एटार्ड अभिक्रिया
- (c) कैनिजारो अभिक्रिया

**अथवा**

(B) निम्न अभिक्रियाओं के अनुक्रम में A, B और C की संरचनाएँ लिखिए : **2 × 1½ = 3**



28. निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए : **3 × 1 = 3**

- (a) ग्लाइकोसाइडी बंध
- (b) अपवृत शर्करा
- (c) ओलिगोसैक्राइड

**खण्ड – घ**

29. शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक का स्वतः प्रवर्तित प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण परिघटना को एक ही आकार के दो अंडों को लेकर प्रदर्शित किया जा सकता है। अंडे में खोल के नीचे और अंडे के पदार्थ के चारों ओर की झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर बाहरी कठोर खोल को हटाया जा सकता है। कठोर खोल को हटाने के बाद एक अंडे को आसुत जल में और दूसरे को संतृप्त नमक के घोल में रखा जाता है। कुछ समय बाद, आसुत जल में रखा अंडा फूल जाता है, जबकि नमक के घोल में रखा अंडा सिकुड़ जाता है। परासरण को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब, परासरण दाब (एक अणुसंख्य गुणधर्म) कहलाता है। प्रतिलोम परासरण तब होता है जब लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब से अधिक हो जाता है।





---

27. (A) Explain the following reactions and write chemical equation involved :


**$3 \times 1 = 3$**

- (a) Wolff-Kishner reduction
- (b) Etard reaction
- (c) Cannizzaro reaction

**OR**

(B) Write the structures of A, B and C in the following sequence of reactions :

**$2 \times 1\frac{1}{2} = 3$**



28. Define the following terms :

**$3 \times 1 = 3$**

- (a) Glycosidic linkage
- (b) Invert sugar
- (c) Oligosaccharides

### **SECTION - D**

29. The spontaneous flow of the solvent through a semipermeable membrane from a pure solvent to a solution or from a dilute solution to a concentrated solution is called osmosis. The phenomenon of osmosis can be demonstrated by taking two eggs of the same size. In an egg, the membrane below the shell and around the egg material is semipermeable. The outer hard shell can be removed by putting the egg in dilute hydrochloric acid. After removing the hard shell, one egg is placed in distilled water and the other in a saturated salt solution. After some time, the egg placed in distilled water swells-up while the egg placed in salt solution shrinks. The external pressure applied to stop the osmosis is termed as osmotic pressure (a colligative property). Reverse osmosis takes place when the applied external pressure becomes larger than the osmotic pressure.





(a) प्रतिलोम परासरण को परिभाषित कीजिए। एक अर्धपारगम्य डिल्ली (SPM) का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया में किया जा सकता है। 2

(b) (i) जब लाल रुधिर कोशिकाओं (RBC) को 0.5%  $\text{NaCl}$  विलयन में रखा जाता है तो आप क्या होने की अपेक्षा करते हैं ? 1


**अथवा**

(b) (ii) 1 M  $\text{KCl}$  अथवा 1 M यूरिया विलयन में से किसका परासरण दाब अधिक होगा। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। 1

(c) परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म क्यों है ? 1

30. ऐमीनों में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसके कारण वे लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं।  $K_b$  का मान जितना अधिक होगा या  $pK_b$  का मान जितना कम होगा, क्षारक उतना ही प्रबल होगा। ऐल्कोहॉल, ईथर, एस्टर आदि की तुलना में ऐमीन अधिक क्षारकीय हैं। ऐलिफैटिक ऐमीन का क्षारकीय गुण ऐल्किल प्रतिस्थापन की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ना चाहिए। लेकिन यह नियमित रूप से नहीं होता है क्योंकि द्वितीयक ऐलिफैटिक ऐमीन अप्रत्याशित रूप से जलीय विलयन में तृतीयक ऐमीन की तुलना में अधिक क्षारकीय होता है। ऐरोमैटिक ऐमीन अमोनिया और ऐलिफैटिक ऐमीन की तुलना में दुर्बल क्षारक होते हैं। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह जैसे  $-\text{CH}_3$ ,  $-\text{OCH}_3$ ,  $-\text{NH}_2$  आदि, क्षारकीयता को बढ़ाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने (अपनयन) वाले प्रतिस्थापित समूह जैसे  $-\text{NO}_2$ ,  $-\text{CN}$ , हैलोजन आदि, ऐमीन की क्षारकीयता को कम करते हैं। इन प्रतिस्थापनों का प्रभाव  $m^-$  स्थितियों की तुलना में  $p^-$  पर अधिक होता है।

(a) निम्नलिखित को उनके क्षारकीय गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कारण दीजिए। 2



(b) मेथिलऐमीन की तुलना में ऐनिलीन का  $pK_b$  मान अधिक क्यों होता है ? 1





---

(a) Define reverse osmosis. Name one SPM which can be used in the process of reverse osmosis. 2

(b) (i) What do you expect to happen when red blood corpuscles (RBC's) are placed in 0.5% NaCl solution ? 1

**OR**


(b) (ii) Which one of the following will have higher osmotic pressure in 1 M KCl or 1 M urea solution. Justify your answer. 1

(c) Why osmotic pressure is a colligative property ? 1

30. Amines have a lone pair of electrons on nitrogen atom due to which they behave as Lewis base. Greater the value of  $K_b$  or smaller the value of  $pK_b$ , stronger is the base. Amines are more basic than alcohols, ethers, esters, etc. The basic character of aliphatic amines should increase with the increase of alkyl substitution. But it does not occur in a regular manner as a secondary aliphatic amine is unexpectedly more basic than a tertiary amine in aqueous solutions. Aromatic amines are weaker bases than ammonia and aliphatic amines. Electron releasing groups such as  $-\text{CH}_3$ ,  $-\text{OCH}_3$ ,  $-\text{NH}_2$ , etc., increase the basicity while electron-withdrawing substituents such as  $-\text{NO}_2$ ,  $-\text{CN}$ , halogens etc., decrease the basicity of amines. The effect of these substituents is more at  $p^-$  than at  $m^-$  position.

(a) Arrange the following in the increasing order of their basic character.

Give reason :



(b) Why  $pK_b$  of aniline is more than that of methylamine ? 1





(c) (i) जलीय विलयन में निम्नलिखित को उनके क्षारकीय गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कारण दीजिए।

1



### अथवा

(c) (ii) शुद्ध ऐमीनों के विरचन के लिए ऐल्किल हैलाइडों का ऐमोनी-अपघटन एक अच्छी विधि क्यों नहीं है ?

1

### खण्ड – ड

31. (A) (a)  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CHO}$  का IUPAC नाम बताइए।

1

(b) प्रोपेनैल और प्रोपेनोन में विभेद करने के लिए एक सरल रासायनिक परीक्षण दीजिए।

1

(c) आप निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करेंगे ?

3

(i) टॉल्यूइन को बेंजोइक अम्ल में



(ii) एथेनॉल को प्रोपेन-2-ऑल में

(iii) प्रोपेनैल को 2-हाइड्रॉक्सीप्रोपेनोइक अम्ल में

### अथवा

31. (B) निम्नलिखित प्रत्येक संश्लेषण में छूटे हुए प्रारंभिक पदार्थ, अभिकर्मक अथवा उत्पादों को देकर पूर्ण कीजिए :

$5 \times 1 = 5$



~~~~~



(c) (i) Arrange the following in the increasing order of their basic character in an aqueous solution : 1



**OR**

(c) (ii) Why ammonolysis of alkyl halides is not a good method to prepare pure amines ? 1

### **SECTION – E**

31. (A) (a) Give IUPAC name of  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CHO}$ . 1

(b) Give a simple chemical test to distinguish between propanal and propanone. 1

(c) How will you convert the following : 3



(i) Toluene to benzoic acid




(ii) Ethanol to propan-2-ol

(iii) Propanal to 2-hydroxy propanoic acid


**OR**

31. (B) Complete each synthesis by giving missing starting material, reagent or products :  $5 \times 1 = 5$







32. (A) (a)  $25^{\circ}\text{C}$  पर निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा ( $\Delta_f G^\circ$ ) का परिकलन कीजिए : 3 + 2



प्रागुक्ति कीजिए कि  $25^{\circ}\text{C}$  पर अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी या नहीं ।

$$[1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}]$$

(b) मलिन चाँदी में  $\text{Ag}_2\text{S}$  होता है । क्या इस मलिनता को मलिन चाँदी के बर्तन को एल्युमिनियम पैन में रखकर हटाया जा सकता है, जिसमें  $\text{NaCl}$  जैसा निष्क्रिय विद्युत अपघटनी विलयन भरा हो ? अर्ध अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रॉड विभव :






### अथवा


32. (B) (a) निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए : 2 + 3

- (i) सेल विभव
- (ii) ईंधन सेल





32. (A) (a) Calculate the standard Gibbs energy ( $\Delta_r G^\circ$ ) of the following reaction at 25 °C : 3 + 2





$$E^\circ_{\text{Au}^{3+}/\text{Au}} = +1.5 \text{ V}, E^\circ_{\text{Ca}^{2+}/\text{Ca}} = -2.87 \text{ V}$$

Predict whether the reaction will be spontaneous or not at 25 °C.

$$[1 \text{ F} = 96500 \text{ C mol}^{-1}]$$

(b) Tarnished silver contains  $\text{Ag}_2\text{S}$ . Can this tarnish be removed by placing tarnished silverware in an aluminium pan containing an inert electrolytic solution such as  $\text{NaCl}$  ? The standard electrode potential for half reaction :



OR

32. (B) (a) Define the following : 2 + 3

- (i) Cell potential
- (ii) Fuel cell



(b) निम्नलिखित सेल के emf की 25 °C पर गणना करें :



$$\text{दिया है : } E_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}}^{\circ} = -0.40 \text{ V}$$

$$E_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^{\circ} = -0.76 \text{ V}$$

$$[\log 10 = 1]$$

33. (A) आण्विक सूत्र  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  वाला कोई कार्बनिक यौगिक 'A'  $\text{CrO}_3$  के साथ अभिक्रिया करके यौगिक 'B' बनाता है। यौगिक 'B' आयोडीन और  $\text{NaOH}$  के जलीय विलयन के साथ गर्म किए जाने पर यौगिक 'C' का पीला अवक्षेप देता है। जब यौगिक 'A' को 413 K पर सांद्र  $\text{H}_2\text{SO}_4$  के साथ गर्म करते हैं तो यौगिक 'D' बनता है जो आधिक्य  $\text{HI}$  के साथ अभिक्रिया करके यौगिक 'E' देता है। यौगिक 'A', 'B', 'C', 'D' और 'E' की पहचान कीजिए तथा सम्मिलित रासायनिक समीकरण लिखिए।

5

### अथवा

33. (B) (a) निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए :  $3 + 1 + 1 = 5$

(i) सांद्र  $\text{HNO}_3$  के साथ फ़ीनॉल की अभिक्रिया

(ii)  $\text{B}_2\text{H}_6$  के साथ प्रोपीन की अभिक्रिया उसके पश्चात उसका  $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$  द्वारा ऑक्सीकरण

(iii) सोडियम t-ब्यूटॉक्साइड के साथ  $\text{CH}_3\text{Cl}$  की अभिक्रिया

(b) ब्यूटेन-1-ऑल और ब्यूटेन-2-ऑल के मध्य विभेद करने के लिए सरल रासायनिक परीक्षण दीजिए।

(c) निम्नलिखित को उनके अम्लीय गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :  
फ़ीनॉल, एथेनॉल, जल



(b) Calculate emf of the following cell at 25 °C :



Given :  $E_{Cd^{2+}/Cd}^{\circ} = -0.40 \text{ V}$

$$E_{Zn^{2+}/Zn}^{\circ} = -0.76 \text{ V}$$

$$[\log 10 = 1]$$

33. (A) An organic compound 'A', molecular formula  $C_2H_6O$  oxidises with  $CrO_3$  to form a compound 'B'. Compound 'B' on warming with iodine and aqueous solution of  $NaOH$  gives a yellow precipitate of compound 'C'. When compound 'A' is heated with conc.  $H_2SO_4$  at 413 K gives a compound 'D', which on reaction with excess  $HI$  gives compound 'E'. Identify compounds 'A', 'B', 'C', 'D' and 'E' and write chemical equations involved.

5

OR

33. (B) (a) Write chemical equations of the following reactions : **3 + 1 + 1 = 5**

- (i) Phenol is treated with conc.  $\text{HNO}_3$
- (ii) Propene is treated with  $\text{B}_2\text{H}_6$  followed by oxidation by  $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ .
- (iii) Sodium t-butoxide is treated with  $\text{CH}_3\text{Cl}$ .

(b) Give a simple chemical test to distinguish between butan-1-ol and butan-2-ol.

(c) Arrange the following in increasing order of acid strength : phenol, ethanol, water





---

56/2/1

731-1

---

~ 24 ~

---



**Marking Scheme  
Strictly Confidential  
(For Internal and Restricted use only)  
Senior School Certificate Examination, 2024-25  
SUBJECT NAME CHEMISTRY (Theory) -043  
(Q.P.CODE 56/2/1) MM: 70**

**General Instructions: -**

You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.

**“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”**

Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**

The Marking scheme carries only suggested value points for the answers

These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.

The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

Evaluators will mark( ✓ ) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right ( ✓ ) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**

If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “**Extra Question**”.

No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

A full scale of marks \_\_\_\_\_ (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.

Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and

evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.

Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-

- Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
- Giving more marks for an answer than assigned to it.
- Wrong totaling of marks awarded on an answer.
- Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
- Wrong question wise totaling on the title page.
- Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
- Wrong grand total.
- Marks in words and figures not tallying/not same.
- Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
- Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)

Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.

While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.

Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.

The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "**Guidelines for Spot Evaluation**" before starting the actual evaluation.

Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.

The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.


## MARKING SCHEME 2024-25

## CHEMISTRY (Theory)- 043



QP CODE 56/2/1

MM: 70


Q. No.	Value points	Mark
<b>SECTION A</b>		
1	(B)	1
2	(C)	1
3	(C)	1
4	(A)	1
5	(B)	1
6	(A)	1
7	(C)	1
8	(B)	1
9	(C)	1
10	(D)	1
11	(D)	1
12	(C)	1
13	(D)	1
14	(A)	1
15	(A)	1
16	(D)	1
<b>SECTION B</b>		
17	$k = \frac{[R]_0 - [R]}{t}$ $t = \frac{0.10 - 0.075}{0.0030}$ $t = \frac{0.025}{0.0030}$ $t = 8.33 \text{ s}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
	OR	
17	$\text{Rate} = \frac{-1 \Delta[NH_3]}{2 \Delta t} = \frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{+1 \Delta[H_2]}{3 \Delta t}$ $\frac{-1 \Delta[NH_3]}{2 \Delta t} = \frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{+1 \Delta[H_2]}{3 \Delta t} = k$ $\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ $\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = 3 \times 2.5 \times 10^{-4}$ $= 7.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
18	(a) The reaction that seems to be of higher order but under certain conditions is of first order. (b) The time in which the concentration of a reactant is reduced to one half of its initial concentration / The time in which half of the reaction is completed.	1 1
19	(a) Due to the presence of unpaired electron in d sub shell/ due to d-d transition. (b) Due to the presence of fully filled d- subshell in ground state and oxidized state.	1 1
20	(a) Tetraammineaquachloridocobalt(III) chloride (b) Dichloridobis(ethane-1,2-diamine)chromium(III) chloride	1 1

21	<p>(a)</p>  <p>, due to the formation of more stable tertiary carbocation.</p> <p>(b) 2-Bromo-2-methylbutane &lt; 2-Bromopentane &lt; 1-Bromopentane.</p>	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ 1
<b>SECTION C</b>		
22	$\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = \frac{w_2 \times M_1}{M_2 \times w_1}$ $\frac{24 - p_1}{24} = \frac{5 \times 18}{60 \times 95}$ $\frac{24 - p_1}{24} = \frac{3}{190}$ $24 - p_1 = \frac{3 \times 24}{190}$ $p_1 = 23.62 \text{ mm Hg}$ <p style="text-align: center;">/ 23.64 mm Hg (Deduct <math>\frac{1}{2}</math> mark for no or incorrect unit).</p>	1 1 1 1 1
23	$\rho = \frac{RA}{l}$ $= \frac{5 \times 10^3 \times 0.8}{40}$ $= 100 \Omega \text{ cm}$ $\kappa = \frac{1}{\rho}$ $= \frac{1}{100}$ $= 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$ $A_m = \frac{\kappa \times 1000}{c}$ $= \frac{10^{-2} \times 1000}{0.05}$ $= 2 \times 10^2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
24	<p>(a)</p> $5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 10\text{CO}_2$ <p>(b)</p> $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$ <p>(c)</p> $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 8\text{H}^+ + 3\text{H}_2\text{S} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{S} + 7\text{H}_2\text{O}$	1 1 1 1

25	<p>(a)</p> <p>Orbitals of <math>\text{Co}^{3+}</math> ion</p> <p><math>3d</math></p> <p><math>4s</math></p> <p><math>4p</math></p> <p><math>d^2sp^3</math> hybridised orbitals of <math>\text{Co}^{3+}</math></p> <p><math>d^2sp^3</math> hybrid</p> <p><math>[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}</math></p> <p>Six pairs of electrons from six <math>\text{NH}_3</math> molecules</p> <p>Hybridization: <math>d^2sp^3</math></p> <p>Magnetic character: Diamagnetic.</p>	$\frac{1}{2}$
	(b)	$\frac{1}{2}$
	<p>Orbitals of Ni</p> <p><math>3d</math></p> <p><math>4s</math></p> <p><math>4p</math></p> <p><math>sp^3</math> hybridised orbitals of Ni</p> <p><math>3d</math></p> <p><math>sp^3</math> hybrid</p> <p>Four pairs of electrons from 4 <math>\text{CO}</math></p> <p>Hybridization: <math>sp^3</math></p> <p>Magnetic character: Diamagnetic.</p>	$\frac{1}{2}$
26.	<p>(a) (i) The stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images.  (ii) A mixture containing dextro and laevo enantiomers in equal proportions.</p> <p>(b) C—Cl bond acquires a partial double bond character due to resonance / the carbon atom of benzene attached to halogen is <math>sp^2</math>-hybridised / Explanation through resonating structures.</p>	1 1 1
27	<p>(A)</p> <p>(a) The carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to <math>\text{CH}_2</math> group on treatment with hydrazine followed by heating with sodium or potassium hydroxide in high boiling solvent such as ethylene glycol</p> <p>(b) Chromyl chloride oxidises methyl group of toluene to a chromium complex, which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde.</p> <p>(c) Aldehydes which do not have <math>\alpha</math>-hydrogen atom, undergo self-oxidation and reduction reaction on heating with concentrated alkali gives salt of carboxylic acid and alcohol</p> <p>(Or any other example)</p>	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
	OR	
27	<p>(B)</p> <p>(a) <math>\text{A} = \text{CH}_3\text{COCl}</math></p> <p>(b) <math>\text{CH}_3\text{CHO}</math></p> <p>(c) <math>\text{CH}_3\text{CH}=\text{NNH}_2</math></p>	$\frac{1}{2} \times 3$

	(b) A = $\text{CH}_3\text{CHO}$	(b) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CHO}$	(c) $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCHO}$	$\frac{1}{2} \times 3$
28	(a) The oxide linkage between two monosaccharides. (b) Hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation, from dextro (+) to laevo (-) and the product is named as invert sugar. (c) Carbohydrates that yield two to ten monosaccharide units, on hydrolysis.			1 1 1
<b>SECTION D</b>				
29	(a) <ul style="list-style-type: none"> <li>When external pressure is larger than the osmotic pressure, then the movement of solvent is from solution to solvent side through semi permeable membrane. / The direction of osmosis can be reversed if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side.</li> <li>Cellulose acetate / Or any other suitable example.</li> </ul> (b) (i) RBC swells up / Cells swell and may even burst due to endo-osmosis. <b>OR</b> (ii) 1 M KCl, $i = 2$ / KCl dissociates into ions, whereas urea does not dissociate. (c) It depends upon the number of solute particles in the solution.			1 1 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1
30	(a)  <p style="text-align: center; margin-left: 400px;">/ Award full marks if attempted because of printing error.</p> <p>(b) Due to resonance in aniline the lone pair of electrons are less available while they are easily available in methyl amine. (c) (i) <math>\text{NH}_3 &lt; (\text{CH}_3)_3\text{N} &lt; \text{CH}_3\text{NH}_2 &lt; (\text{CH}_3)_2\text{NH}</math> <b>OR</b> (ii) A mixture of primary, secondary and tertiary amines and also a quaternary ammonium salt is formed.</p>			2 1 1
<b>SECTION E</b>				
31	(a) But-2-enal (b) On heating with $\text{NaOH} + \text{I}_2$ , propanone gives yellow ppt. Of iodoform ( $\text{CHI}_3$ ) whereas propanal does not. (c) (i)  (ii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{PCC}} \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[2. \text{H}_3\text{O}^+]{1. \text{CH}_3\text{MgBr}} \text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$			1 1 1 1

(iii)



(Or any other correct method)


1

OR


31

(B)


(a)




(b)



(c)



(d)

(e)  $\text{CH}_3\text{COCl}$  / Anhy.  $\text{AlCl}_3$  or  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  / Anhy.  $\text{AlCl}_3$ 1  $\times$  5 = 5

32

(A)

$$(a) E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$$

$$= -2.87 - 1.5 \text{ V}$$

$$= \mathbf{-4.37 \text{ V}}$$

$$\Delta G^\circ = -nF E^\circ_{\text{cell}}$$

$$= -6 \times 96500 \times (-4.37)$$

$$= 2530.230 \text{ kJ/mol}$$

Reaction is non-spontaneous.

½

½

1

1

(b) Yes, the tarnish can be removed.

Aluminium has more negative standard electrode potential than silver so will reduce silver sulphide to silver, tarnish will be removed. /

1

1



$$E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$$

$$= -0.71 - (-1.66) \text{ V}$$


$$= 0.95 \text{ V}$$

This indicates that the reaction is feasible and tarnish can be removed.

1


**OR**

32	<p>(B)</p> <p>(a) (i) Potential difference between two electrodes of a galvanic cell.  (ii) The galvanic cell in which combustion energy of fuels is directly converted into electrical energy.</p> <p>b)</p> <p><math>n = 2</math></p> $E^{\circ}_{\text{cell}} = E^{\circ}_{\text{cathode}} - E^{\circ}_{\text{anode}}$ $= -0.40 - (-0.76) \text{ V}$ $= 0.36 \text{ V}$ $E_{\text{Cell}} = E^{\circ}_{\text{cell}} - \frac{0.059}{2} \log \left[ \frac{Zn^{2+}}{Cd^{2+}} \right]$ $= [0.36] - \frac{0.059}{2} \log \frac{0.1}{0.01}$ $= (0.36 - 0.0295)$ $= 0.3305 \text{ V}$	1 1  1 1  1
33	<p>(A) A = <math>\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}</math> / Ethanol / Ethyl alcohol,  B = <math>\text{CH}_3\text{CHO}</math> / Ethanal / Acetaldehyde,  C = <math>\text{CHI}_3</math> / Iodoform / Triiodomethane,  D = <math>\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3</math> / Ethoxyethane / Diethyl ether,  E = <math>\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}</math> / Ethyl iodide / Iodoethane.</p>	$\frac{1}{2} \times 5$



**OR**

33	<p>(B) (a)</p> <p>(i)</p> <p>(ii)</p> $3 \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + (\text{H}-\text{BH}_2)_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O} \downarrow, 3\text{H}_2\text{O}_2, \text{OH}} (\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2)_3\text{B} \\ 3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ <p>(iii)</p>	1   1  1
----	---	-------------------------



(b) On heating with  $\text{NaOH} + \text{I}_2$ , Butan-2-ol gives yellow ppt. Of iodoform ( $\text{CHI}_3$ ) whereas Butan-1-ol does not.


(Or any other suitable chemical test)









(c) Ethanol < Water < Phenol.

1

1

Q. No.	मुल्यांकन विद् राज्यक विद्	Mark
1	(B)	1
2	(C)	1
3	(C)	1
4	(A)	1
5	(B)	1
6	(A)	1
7	(C)	1
8	(B)	1
9	(C)	1
10	(D)	1
11	(D)	1
12	(C)	1
13	(D)	1
14	(A)	1
15	(A)	1
16	(D)	1
	राज्यक विद्	
17	$k = \frac{[R]_0 - [R]}{t}$ $t = \frac{0.10 - 0.075}{0.0030}$ $t = \frac{0.025}{0.0030}$ $t = 8.33 \text{ s}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
	OR अप्पा	
17	$\text{Rate} = \frac{-1 \Delta[NH_3]}{2 \Delta t} = \frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{+1 \Delta[H_2]}{3 \Delta t}$ $\frac{-1 \Delta[NH_3]}{2 \Delta t} = \frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = \frac{+1 \Delta[H_2]}{3 \Delta t} = k$ $\frac{\Delta[N_2]}{\Delta t} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ $\frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = 3 \times 2.5 \times 10^{-4}$ $= 7.5 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
18	<ol style="list-style-type: none"> <li>ऐसी अभिक्रिया हो प्रथम कोटि वेग नियम का अनुसरण करती है, यद्यपि वास्तविकता में वह उच्च कोटि की अभिक्रिया होती है।</li> <li>ऐसी अभिक्रिया में अभिक्रियक की प्रारंभिक सांकेतिक आधे होने में जितना समय लगता है। वह समय जिसमें अभिक्रिया का आधे मात्रा पूर्ण हो जाता है।</li> </ol>	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
19	<ol style="list-style-type: none"> <li>असुस्थित, इलेक्ट्रॉन की व-कक्षक में उपस्थिति के कारण/ व-व संक्रमण के कारण।</li> </ol>	1

	<p>6) मूल अवस्था तभा औक्सीकृत अवस्था दोनों में ही प-कक्षक के पूर्ण भरित होने के कारण।</p>	1
20	<p>a) ट्रैट्रैमीनसबवाक्लोरिडोकोबाल्ट (II) क्लोराइड b) डाइक्लोरिडोबिस (एथेन-1,2-डाइसीन) क्रोमियम (III) क्लोराइड</p>	1 1
21	<p>(a)</p>  <p>अधिक स्थायित्व वाले तृतीयक कार्बोकैटायन के बनने के कारण</p> <p>(b) 2-ब्रोमो-2-मैथिलब्यूटेन &lt; 2-ब्रोमोपैन्टेन &lt; 1-ब्रोमोपैन्टेन</p>	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ 1
	<b>ANSWER</b>	
22	$\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = \frac{w_2 \times M_1}{M_2 \times w_1}$ $\frac{24 - p_1}{24} = \frac{5 \times 18}{60 \times 95}$ $\frac{24 - p_1}{24} = \frac{3}{190}$ $24 - p_1 = \frac{3 \times 24}{190}$ $p_1 = 23.62 \text{ mm Hg}$ <p style="text-align: right;">/ 23.64 mm Hg (इकाई गलत गार्ने होने केर 1/2 संकराएँ)</p>	1 1 1 1 1
23	$\rho = \frac{RA}{l}$ $= \frac{5 \times 10^3 \times 0.8}{40}$ $= 100 \Omega \text{ cm}$ $K = \frac{1}{\rho}$ $= \frac{1}{100}$ $= 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

	$A_{\text{m}} = \frac{\kappa \times 1000}{C}$ $= \frac{10^{-2} \times 1000}{0.05}$ $= 2 \times 10^2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$	½
24	(a) $5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 10\text{CO}_2$ (b) $2\text{KMnO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2$ (c) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 8\text{H}^+ + 3\text{H}_2\text{S} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{S} + 7\text{H}_2\text{O}$	1 1 1
25	(a) $\text{Co}^{3+}$ आयन के कक्षक  $\text{Co}^{3+}$ के $d^2sp^3$ संकरण कक्षक  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$  $\text{NH}_3$ अणुओं से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युगल  संकरण: $d^2sp^3$ युंत्वकीय प्रवृत्ति: प्रतियुंत्वकीय	½ ½ ½ ½
	(b) $\text{Ni}^{2+}$ के कक्षक  $\text{Ni}^{2+}$ के $sp^3$ संकरित कक्षक  $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$  $\text{NH}_3$ अणुओं के द्वारा युगल  संकरण: $sp^3$ युंत्वकीय प्रवृत्ति: प्रतियुंत्वकीय	½ ½
26.	(ल) (प) जिन जिवित समावयियों का संबंध परस्पर अधारोपित न हो सकते वाले दर्पण प्रतिविकों की तरह होते हैं, उन्हें प्रतिविक रूप कहते हैं।	1

	<p>(ii) मित्रण जिसमें प्रतिक्रिया रूपों के दलित धूतण धूर्णिक और वाम धूतण धूर्णिक समान अनुपात में उपस्थित होते हैं।</p> <p>(b) अनुनाद के कारण C-CH<sub>3</sub> आवेदा में ओशिक द्विबंध के गुण जो के कारण / बेनजील का कार्बन परमाणु जो हैलोजन से पुड़ा है, इसे संकरित होता है / अनुनादी संरचनाओं के द्वारा व्याख्या।</p>	1
27	<p>(A)</p> <p>(a) सेलिक्स कीटोनों का कार्बोनिल समूह हाइड्रोफीन के साथ अभिक्रिया करने के बाद, सेलिलीन रलाइकॉल जैसे उच्च कवर्धनों के बाले विलायक में सोडियम मा पोर्टेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गए करने पर C<sub>2</sub>H<sub>2</sub> समूह में परिवर्तित हो जाता है।</p> $\text{C=O} \xrightarrow[-\text{H}_2\text{O}]{\text{NH}_2\text{NH}_2} \text{C=NNH}_2 \xrightarrow[\text{उष्णा}]{\text{KOH/सेलिलीन रलाइकॉल}} \text{CH}_2 + \text{N}_2$ <p>(b) क्रोमिल क्लोराइड में मिल समूह को एक क्रोमियम स्क्रूल में आकसीकृत कर देता है जो जल अपघटन द्वारा संगत बेनजीलिक्स बनाता है।</p> $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3 \xrightarrow[2. \text{H}_3\text{O}^+, \Delta]{1. \text{CrO}_2\text{Cl}_2, \text{CS}_2} \text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ <p>(c) सेलिक्स, जिसमें १-हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते सांत्र क्षार की उपस्थिति में गए करने से एवं आकसीकरण व अपघटन का अभिक्रिया से कार्बोक्रिस्टलिक उमल के लवण और एल्कोहॉल देता है।</p> $2 \text{C}_6\text{H}_5\text{CHO} + \text{Conc. NaOH} \xrightarrow{\Delta} \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH} + \text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ <p>(या कीट अन्य उत्पाद)</p>	<p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p> <p>1/2</p>
27	<p>(B)</p> <p>(a) A = CH<sub>3</sub>COCl      (b) CH<sub>3</sub>CHO      (c) CH<sub>3</sub>CH=NNH<sub>2</sub>      (b) A = CH<sub>3</sub>CHO      (b) CH<sub>3</sub>CH(OH)CH<sub>2</sub>CHO      (c) CH<sub>3</sub>CH=CHCHO</p>	<p>1/2 x 3</p> <p>1/2 x 3</p>

28	<p>(a) दो मोनोसैक्साइडों के बीच ऑक्साइड बंधा।</p> <p>(b) जल अपघटन पर सुक्रोस के धूर्णन के यिन्ह में परिवर्तन दक्षिण (+) से वाम (-) में हो जाता है और उत्पाद की अपवृत्त शक्ति कहते हैं।</p> <p>(c) कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैक्साइड की दो से दस तक इकाइयाँ प्राप्त होती हैं।</p>	1 1 1
29	<p><u>खण्ड ६</u></p> <p>(a) जब बाल दाना परासरण दाना से अधिक होता है तो विलायक अर्थात् पारगम्य शिल्पी के माध्यम से विलयन में से विलायक में पारगम्यन करता है। विलयन पर परासरण दाना से अधिक दाना लगाकर परासरण की दिशा को प्रतिवर्तित किया जा सकता है।</p> <p><u>सोल्यूशन सेसीटेट/अथवा कोई उपयुक्त उदाहरण</u></p> <p>(b) प्रथम कोशिका फूल जाती है। कोशिकाएँ फूल जाती हैं और अंतःपरासरण के कारण फट भी सकती हैं।</p> <p><u>अथवा</u></p> <p>(i) <math>1M KCl</math> <math>\text{I}_2 / KCl</math> अन्यनों से विचोरित हो जाता है जबकि यूरिया विचोरित नहीं होता।</p> <p>(c) यह विलयन में विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है।</p>	1 1 1 1 1 1
30	<p>(a)</p> <p></p> <p><u>मुद्रण कृति के कारण प्रयास करने पर पूछे जाने के दिन खास</u></p>	2

(b) ऐनिलीन में अनुनाद के कारण असाध्यायित इलेक्ट्रॉन युग्मल के पृष्ठ उपलब्ध होता है जबकि मेथिलस्ट्रीमीन में वह आसानी से उपलब्ध होता है।

(c) (i)  $\text{NH}_3 < (\text{CH}_3)_3\text{N} < \text{CH}_3\text{NH}_2 < (\text{CH}_3)_2\text{NH}$

(ii) प्रायमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक से मीन तथा अतुष्टक अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है।

1

1

प्रृष्ठ - 3.


31 (a) एम्बर-2-इनल

(b) प्रोपेनोन को  $\text{NaBH}_4 + \text{I}_2$  के साथ जारी करने पर पीले रंग का अवश्यक प्राप्त होता है जबकि प्रोपेनैल नहीं होता।

(या कोई अन्य उपयुक्त रासायनिक परीक्षण)

(c)


(i)



(ii)




(iii)




अध्यव

31

(B)  
(a)




(b)




(c)

$1 \times 5 =$   
5



(d)



(e)  $\text{CH}_3\text{COCl}$  / Anhy.  $\text{AlCl}_3$  or  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  / Anhy.  $\text{AlCl}_3$

32

(A)

$$\begin{aligned} (a) E^\circ_{\text{cell}} &= E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} \\ &= -2.87 - 1.5 \text{ V} \\ &= -4.37 \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \Delta G^\circ &= -nF E^\circ_{\text{cell}} \\ &= -6 \times 96500 \times (-4.37) \\ &= 2530.230 \text{ kJ/mol} \end{aligned}$$

अभिक्रिया स्वतः अप्रवर्तित है।

1/2  
1/2  
1  
1

(b) हाँ, मलिनता को हटाया जा सकता है।

गैल्वनी नियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव यांदी से अधिक प्रणालीकृत होता है ताकि  $\text{Ag}_2\text{S}$  को यांदी में अपचयित किया जा सकता है, मलिनता को हटाया जा सकता है।



$$\begin{aligned} E^\circ_{\text{cell}} &= E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} \\ &= -0.71 - (-1.66) \text{ V} \\ &= 0.95 \text{ V} \end{aligned}$$

यह दर्शाता है कि अभिक्रिया संभव है और मलिनता को हटाया जा सकता है।

अधिकारी

32

(B)

(i) गैल्वनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर  
(ii) गैल्वनी सेल जिसमें दूधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।

1  
1

b)

$$n = 2$$

$$\begin{aligned} E^\circ_{\text{cell}} &= E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}} \\ &= -0.40 - (-0.76) \text{ V} \end{aligned}$$

	$= 0.36 \text{ V}$ $E_{\text{Cell}} = E_{\text{cell}}^{\circ} - \frac{0.059}{2} \log \left[ \frac{\text{Zn}^{2+}}{\text{Cd}^{2+}} \right]$ $= [0.36] - \frac{0.059}{2} \log \frac{0.1}{0.01}$ $= (0.36 - 0.0295)$ $= 0.3305 \text{ V}$	1 1 1
33	<p>(A) A = <math>\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}</math> / एथेनॉल / एथिल एल्कोहॉल      B = <math>\text{CH}_3\text{CHO}</math> / एथेनैल / सेसी एल्किल      C = <math>\text{CHI}_3</math> / आयोडोफॉस्म / ड्राइ आयोडो मैथेन      D = <math>\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3</math> / एथोक्सीएथैन / डाइएथिल इथर      E = <math>\text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}</math> / एथिल आयोडाइड / आयोडोएथेन</p> <p style="text-align: center;"><math>\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{CrO}_3} \text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow{\text{NaOH} + \text{I}_2} \text{CHI}_3</math></p> <p style="text-align: center;"><math>\downarrow \text{conc. H}_2\text{SO}_4 \quad 413 \text{ K}</math></p> <p style="text-align: center;"><math>\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{HI (आयोड)} \quad \text{2} \quad \text{3}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{I}</math></p>	$\frac{1}{2} \times 5$ $\frac{1}{2} \times 5$
33	<p>(B) (a)</p> <p>(i)</p> <p style="text-align: center;"><math>\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} \xrightarrow{\text{Conc. HNO}_3} \text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_2\text{OH}</math></p> <p>(ii)</p> <p style="text-align: center;"><math>3 \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + (\text{H}-\text{BH}_2)_2 \xrightarrow{\text{H}_2\text{O} \downarrow \text{3H}_2\text{O}_2, \text{OH}} 3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}</math></p> <p>(iii)</p> <p style="text-align: center;"><math>\text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)(\text{O}^{\text{+}}\text{Na}^+) + \text{CH}_3\text{Cl} \rightarrow \text{CH}_3\text{C}(\text{CH}_3)(\text{O}^{\text{+}}\text{CH}_3) + \text{NaCl}</math></p> <p>(b) एथेनैल-2-ओल को <math>\text{NaOH} + \text{I}_2</math> के साथ चर्च करने पर पीले रंग के अवशेष <math>(\text{CHI}_3)</math> प्राप्त होता है जिसके एथेनैल-1-ओल नहीं होता।</p> <p>(c) एथेनॉल &lt; जॉल &lt; फीतॉल</p>	1 1 1 1 1